

Далидович В.С.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ЯЧНИКАХ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ КАК ФАКТОР РИСКА ПНЯ

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Можейко Л.Ф.

*Акушерства и гинекологии с курсом повышения квалификации и переподготовки
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Актуальность. Преждевременная недостаточность яичников представляет значимую клиническую проблему, поскольку развивается у женщин моложе 40 лет, снижает их репродуктивный потенциал и ассоциирована с бесплодием и соматическими последствиями. Кроме того, отмечается тенденция приверженности женщин к более позднему возрасту первых родов. Анализируя данные современных исследований, отмечается увеличение частоты указанной патологии с 1% до 3,5% за 10 летний период. Согласно международным руководствам, хирургические вмешательства на яичниках отнесены к модифицируемым факторам риска ПНЯ. Особую актуальность данной проблемы придает высокая частота поражений придатков в молодом возрасте (7,8%). Несмотря на множество публикаций, до настоящего времени нет четкого определения и критериев сниженного овариального резерва. Более того, в последние годы используется в общей сложности 41 термин для определения сниженного овариального резерва. На сегодняшний день остается предметом дискуссии снижение овариального резерва, который по разным данным исследователей варьирует от 5,6% до 35,1%. Овариальная недостаточность представляет собой континуум нарушений функции яичников, а не конкретное дихотомическое состояние. Она бывает преходящей или прогрессирующей и обычно приводит к бесплодию и возможной преждевременной менопаузе.

Цель: проанализировать медицинскую документацию пациентов с диагнозом ПЯН в «УЗ Минский городской клинический эндокринологический центр» для выявления факторов риска. Оценить морфологическую структуру удаленных тканей яичников в возрастной группе женщин с 14 до 21 лет, прооперированных в гинекологическом стационаре УЗ «1 ГКБ» г. Минска.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации пациенток с новообразованиями яичников и их морфологической структуры в возрасте с 14 до 21 лет ($n = 245$), которые были прооперированы методом лапароскопии. Пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу вошли женщины 14-17 лет ($n = 121$), во вторую группу 18-21 лет ($n = 124$). Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью «Microsoft Office Excel 2019».

Результаты и их обсуждение. Оценивая данные морфологического исследования удаленных тканей были получены следующие результаты: в первой группе диагностирована фолликулярная киста в 22 (26,4%) случаев, во второй группе – в 23 (27,8%) случаев, киста желтого тела наблюдалась у 13 (15,7%) пациенток первой группы и у 15 (18,6%) женщин во второй группе. Тератомы были выявлены у 14 (17,1%) женщин первой группы и у 16 (19,8%) женщин второй группы. Серозная цистаденома яичника диагностирована в 15 (18,1%) случаев в первой группе женщин и в 16 (19,8%) случаев во второй группе. Муцинозная цистаденома яичника наблюдалась у 6 (7,3%) пациенток в первой группе и у 6 (7,4%) во второй группе женщин. Эндометриоидные кисты яичников наблюдались у 6 (7,3%) женщин в первой группе и у 8 (9,9%) пациенток во второй группе.

Выводы. Таким образом, оценивая результаты морфологических заключений функциональные кисты наблюдались у 35 (42,35%) пациенток в первой группе и у 38 (47,12%) пациенток во второй группе. Высокий процент функциональных кист у женщин в обеих группах с нереализованной репродуктивной функцией указывает на необходимость рассмотрения более щадящих методов лечения, их диспансерного наблюдения для дальнейшей реализации репродуктивной функции.