

Сравнительная оценка прогностической эффективности интегральных индексов интоксикации у пациентов с острым одонтогенным синуситом верхнечелюстной пазухи

Кравченко Вероника Олеговна

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Походенько-

Чудакова Ирина Олеговна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск,

Введение

Актуальность рассматриваемого вопроса определяется значительной распространенностью данного заболевания, которая составляет 5–12% пациентов от общего числа лиц получающих помощь в специализированных стоматологических стационарах и не имеет тенденции к снижению на современном этапе (Т. В. Зотова, 2011; А. П. Мирошниченко, Е. Н. Степанов, 2014).

Цель исследования

Сравнить прогностическую эффективность интегральных индексов интоксикации у пациентов с острым одонтогенным синуситом ВЧП.

Материалы и методы

Анализировали данные 88 лиц 19 – 57 лет. Группу 1 составили 15 человек без патологии ВЧП. Группа 2: 15 пациентов, которым на основании данных лучевых методов исследования был верифицирован диагноз – острый одонтогенный синусит ВЧП. Группа 3: 50 пациентов с диагнозом острый одонтогенный синусит ВЧП, результаты лечения и индексы эндогенной интоксикации рассчитывали на основании данных ретроспективного анализа архивного материала. Данные обрабатывали статистически в программе «Statistica 10.0».

Результаты

Прогностическая эффективность ЛИИО у пациентов с острым одонтогенным синуситом ВЧП составила 82%. Аналогичный показатель по данным ЯИ был равен 69%. Прогностическая эффективность ИСЛК для данной нозологии равнялась 75%.

Выводы

Представленные результаты доказывают прогностическую эффективность индексов эндогенной интоксикации (ЛИИО, ЯИ, ИСЛК) у пациентов с острым одонтогенным синуситом ВЧП и убеждают в целесообразности их практического использования, как в стационаре, так и на амбулаторном приеме стоматолога-хирурга.